Concentré Accel PREVention (7 %) *Mode d'emploi*

Ce document a été rédigé conformément à la réglementation et aux directives en vigueur sur le contrôle des infections. Il doit être utilisé à des fins de référence uniquement. Il ne doit en aucun cas remplacer la documentation existante de l'établissement sans l'autorisation écrite du directeur de ce dernier.

Description du produit

Pourquoi choisir le concentré Accel PREVention ?

Grâce à son efficacité à large spectre d'action et à ses temps de contact réalistes, le concentré Accel PREVention garantit, à l'utilisateur, des produits conformes et respectueux des protocoles. Le concentré Accel PREVention est **certifié EcoLogo** et convient parfaitement au nettoyage et à la désinfection quotidiens des grandes surfaces au contact des mains. Disponibles en formats uniques :

- *Bouteille doseuse de 32 onces liquides : bouteille doseuse facile à utiliser permettant une diffusion précise de la solution concentrée*
- *Bouteille de 5 litres pour système à circuit fermé : conception à circuit fermé conçue pour éviter l'exposition de l'utilisateur à la solution concentrée et pour une utilisation avec le système de dilution Accel*

Quels sont les revendications d'activité, les temps de contact, les recommandations de dilution et la durée de conservation du concentré Accel PREVention ?

Revendications : **5 minutes avec une dilution de 1/40 :** bactéricide, virucide général, fongicide et tuberculocide
30 secondes avec une dilution de 1/128 : assainissement à large spectre

Recommandations de dilution : **1/40 :** désinfection à large spectre d'action | **1/128 :** assainissement à large spectre | **1/256 :** Les traveaux de nettoyage légers

Durée de conservation : **24 mois :** concentré | **30 jours :** dilué

Recommandations de dilution du concentré Accel PREVention

Accel propose une gamme de systèmes de diffusion et de dilution permettant une dilution simple et précise du concentré Accel PREVention. Consultez la rubrique Accessoires du site Web d'Accel Canada pour des informations complémentaires : (http://viroxaccel.ca/accessories.html)

Guide de dilution

Rapport	*Pour 1 litre d'eau*	*Pour 32 onces liquides d'eau*	*Pour 4 litres d'eau*	*Pour 1 gallon US d'eau*
1/40	25 ml	0,8 oz liq.	100 ml	3,2 oz liq.
1/128	8 ml	0,25 oz liq.	32 ml	1 oz liq.
1/256	4 ml	0,125 oz liq.	16 ml	0,5 oz liq.

Déterminer la méthode de diffusion souhaitée pour le concentré Accel PREVention : solution à 7 % de PHA (peroxyde d'hydrogène accéléré) diluée à un rapport de 1/40 pour la désinfection ou un rapport de 1/128 pour l'assainissement et le nettoyage des surfaces.

Formats uniques - Mode d'emploi

Bouteille doseuse de 32 onces liquides

***Désinfection** (1/40)*

- Presser la bouteille et remplir jusqu'au repère de 30 ml (1 oz liq.)
- Retirer le bouchon et verser la solution dans le bac à dilution
- Ajouter 1,15 L (39 oz liq.) d'eau et bien mélanger

***Assainissement** (1/128)*

- Presser la bouteille et remplir jusqu'au repère de 30 ml (1 oz liq.)
- Retirer le bouchon et verser la solution dans le bac à dilution
- Ajouter 3,78 L (1 gallon) d'eau et bien mélanger

Bouteille de 5 litres pour système à circuit fermé

- Retirer le bouchon à vis de la bouteille de 5 L du concentré PREVention
- Fixer le bouchon compatible du système de dilution Accel sur la bouteille de 5 L (le bouchon compatible doit être fixé au raccord à l'intérieur de la bouteille de 5 L afin de permettre l'écoulement du concentré)
    - Consulter le mode d'emploi du système de dilution Accel pour des instructions complémentaires

Concentré Accel PREVention (7 %) *Mode d'emploi*

Barrières de protection

Le port d'un équipement de protection individuelle (EPI) est-il nécessaire lors de l'utilisation du concentré Accel PREVention ?

L'utilisation du concentré Accel PREVention aux dilutions indiquées ne nécessite pas le port d'un équipement de protection individuelle (EPI). Cependant, les bonnes pratiques pour le contrôle et la prévention des infections recommandent l'utilisation adéquate d'un EPI, ainsi que son retrait et sa mise au rebut sécuritaires, afin d'éviter la propagation des maladies infectieuses.

1. Gants jetables. Les gants doivent être remplacés selon les besoins, notamment s'ils sont déchirés, si les mains se mouillent à l'intérieur des gants, ou lors des déplacements d'une chambre de patient ou d'une salle à une autre.
2. Des gants de ménage peuvent être utilisés, mais ils doivent être jetés une fois le nettoyage terminé.

Bonnes pratiques pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et des dispositifs non critiques

Comment nettoyer et désinfecter les surfaces et les dispositifs non critiques avec le concentré Accel PREVention RTU ?

1. Rassembler tout le matériel nécessaire au nettoyage des dispositifs ou des surfaces. Vérifier la date limite d'utilisation sur la bouteille du concentré Accel PREVention. Jeter si la date est dépassée et utiliser une nouvelle bouteille.
2. SE LAVER les mains et mettre des gants avant de procéder au nettoyage. Remplacer l'équipement de protection individuelle s'il est déchiré ou souillé.
3. Éliminer les souillures visibles ou évidentes, le sang et/ou les liquides biologiques avant le nettoyage et la désinfection.
4. Nettoyage et désinfection de toutes les surfaces :
    a. Appliquer le concentré Accel PREVention dilué à 1/40 et permettre ainsi aux surfaces de rester mouillées pendant 5 minutes afin de favoriser l'action bactéricide, virucide générale et tuberculocide.
    b. Pour éviter toute contamination croisée, remplacer les chiffons lorsqu'ils sont sales ou avant de passer à une nouvelle surface.
    c. Si un système à seau ouvert est utilisé, veiller à ne pas contaminer la solution (NE JAMAIS RETREMPER).
5. Mettre les chiffons sales dans un sac en vue de leur blanchissage. Jeter les chiffons jetables dans des sacs poubelles avec les déchets ordinaires.
6. Enlever et jeter les gants, SE LAVER les mains.

Bonnes pratiques pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et des dispositifs non critiques contaminés par du sang ou des liquides biologiques

Comment nettoyer et désinfecter les surfaces et les dispositifs non critiques contaminés par du sang ou des liquides biologiques avec Accel PREVention RTU ?

1. SE LAVER les mains et mettre des gants.
2. En cas de risque d'éclaboussures, porter un écran facial de protection et une combinaison. En cas de déversements importants, porter une blouse, une combinaison ou un tablier ainsi que des bottes ou des couvre-chaussures. Remplacer l'équipement de protection individuelle s'il est déchiré ou souillé, et toujours l'enlever avant de quitter les lieux.
3. Appliquer le concentré Accel PREVention dilué à 1/40 au déversement **et laisser agir 30 secondes.**
4. Essuyer le sang avec des papiers absorbants jetables. Jeter les papiers absorbants dans un récipient à déchets doté d'un sac en plastique.
5. Vaporiser ou essuyer les surfaces avec le concentré Accel PREVention dilué à 1/40 **et laisser agir 5 minutes.** Sécher avec des papiers absorbants jetables. Jeter les papiers absorbants de la manière indiquée ci-dessus.
6. Retirer les gants et les jeter dans un récipient à déchets doté d'un sac en plastique.
7. Se laver les mains.

Concentré Accel PREVention (7 %) *Mode d'emploi*

Récapitulatif du mode d'emploi

Nettoyer

Éliminer toutes les souillures visibles ou évidentes des surfaces

Essuyer

Appliquer sur les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient bien mouillées

Laisser agir

5 minutes pour atteindre le temps de contact nécessaire à la désinfection